

がんサポ通信

【第36号】
令和元年6月14日
がん診療支援・
緩和ケア委員会
発行

令和元年 がん診療支援・緩和ケア委員会メンバーです



どうぞよろしく申し上げます



「e-learningではじめる、初めての緩和ケア」勉強会

令和元年6月4日、日本海病院2F講堂にて行われました。
その場で厚生労働省のE-learningに参加登録して学習し、今回は初心者向けの緩和ケア勉強会でしたが、院内25人、院外6人、総勢31人の参加者でした。

「e-learning」の詳細につきましては、「厚生労働省 がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会e-learning」のサイト (<https://peace.study.jp/pcontents/top/1/index.html>) をご参照下さい。



薬の紹介

<タペンタ ドール製剤・・・医療用麻薬> 限定採用

☆タペンタ錠 25mg・50mg・100mg(徐放性製剤)

特徴:

- ・ μ 受容体への直接作用とノルアドレナリン再取り込み阻害作用の2つの作用を有する。
- ・嘔気・嘔吐や便秘などの消化器症状が少ないとされている。
- ・細長い錠剤、長径17mm、短径7mm、厚さ5mm(カロナール500mgと同じくらい)

注意点:

- ・乱用防止などを目的として改変防止技術が施されている。そのため錠剤が非常に硬く、噛んだり粉砕したり水や他の溶媒に溶かすことができないようになっている。



OMJ 25

長径 17.0 mm
短径 7.0 mm
厚さ 5.0 mm

<スインプロイク・・・オピオイド誘発性便秘症治療薬> 限定採用

☆スインプロイク錠 0.2mg

特徴:

- ・消化管のオピオイド受容体を拮抗して、オピオイド鎮痛薬による便秘を改善する。
- ・黄色の円形の錠剤、直径6.5mm、厚さ3.5mm



直径 6.5mm
厚さ 3.5mm

緩和ケアの申し込み・お問い合わせは緩和ケアリンクナースまたは認定看護室へ(内線:7267)