レジメン名	セツキシマブ+パクリタキセル療法											
略名	CET(q2w)+PTX		1クールの日数									28日
適応病名	頭頸部癌(SCC)		予定クール回数									PDまで
薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day 1	day	day 8	day	day 15	day	day 28	実投与量
生理食塩液	100 mL	100 mL	div	keep	↑		↑		↑			
デキサート ファモチジン ポララミン	6.6 mg 20 mg 5 mg	6.6 mg 20 mg 5 mg	iv	ゆっくり	↑		↑		↑			
セツキシマブ 生理食塩液	500 mg/m2 500-投与量mL	mg 500 mL	div	2時間	↓				↓			
生理食塩液	100 mL	100 mL	div	1時間	↑				↑			
パクリタキセル 5%ブドウ糖液	100 mg/m2 250 mL	mg 250 mL	div	1時間	↓		↓		↓			

用量調節

	1段階減量	2段階減量
セツキシマブ	400 mg/m2(Day 1, 15)	300 mg/m2(Day 1, 15)
パクリタキセル	80 mg/m2(Day 1, 8, 15)	60 mg/m2 (Day 1, 8, 15)or 80 mg/m2 (Day 1, 15)