

レジメン名		頭頸部癌PF(CBDCA)+Cetuximab												
略名		PF(CBDCA)+C-mab		1クールの日数				21日						
適応病名		頭頸部癌		予定クール回数				PF療法:最大6サイクル★						
薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day 1	day 2	day 3	day 4	day 8	day 15	day 21	実投与量		
レスタミン錠10mg	5錠	5錠	経口	30分前	↑				↑	↑				
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	keep	↑				↑	↑				
グラニセトロン デキサート	3mg/100mL 6.6 mg	3mg/100mL 6.6 mg	div	30分	↑									
生理食塩液 デキサート	50 mL 6.6 mg	50 mL 6.6 mg	div	30分					(↑)注	(↑)注				
アービタックス※ 生理食塩液	250 mg/m2 250-投与量mL	mg 250 mL	div	1時間	↓				↓	↓				
生理食塩液	250 mL	250 mL	div	1時間	↑				↑	↑				
カルボプラチン 5%ブドウ糖液	AUC=5 250 mL	mg 250 mL	div	1時間	↓									
5-FU ソルラクト	1000 mg/m2 1000 mL	mg 1000 mL	div	24時間	↓	↓	↓	↓						

※1クール目 day1のみ

アービタックス 生理食塩液	400 mg/m2 500-投与量mL	mg 500 mL	div	2hr	↓								
------------------	------------------------	--------------	-----	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--

(注)day8.15のデキサートはInfusion reactionの予防として主治医が必要と判断した場合に使用する

★6サイクル施行後はアービタックスのみ継続する。