

| レジメン名 | 肺癌カルボプラチン+アリムタ療法 | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------|---------|-------|-----|----------|-------|-------|---------|------------|------|
| 略名 | CBDCA+PEM | | 1クールの日数 | | | 21or28 日 | | | | | |
| 適応病名 | 肺癌 | | 予定クール回数 | | | 2~6 回 | | | | | |
| 薬品名 | 1日投与量 | 計算投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 7日前 | day 1 | day 2 | day 3 | day ... | day 21or28 | 実投与量 |
| 生理食塩液 | 500 mL | 500 mL | div | 3hr | | ↑ | | | | | |
| パロノセトロン | 0.75 mg | 0.75 mg | iv | 10min | | ↑ | | | | | |
| デキサート | 6.6 mg | 6.6 mg | | | | | | | | | |
| ペムレキセド | 500 mg/m ² | mg | div | 10min | | ↓ | | | | | |
| 生理食塩液 | 100-投与量 mL | 100 mL | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 100 mL | 100 mL | div | 30min | | ↑ | | | | | |
| カルボプラチン | AUC=4~5 | mg | div | 1hr | | ↓ | | | | | |
| 生理食塩液 | 250 mL | 250 mL | | | | | | | | | |
| ヘパリンロック | 1 筒 | 1 筒 | iv | | | ↑ | | | | | |
| アプレピタントカプセル | 125 mg | 125 mg | 経口 | | | ↓ | | | | | |
| | 80 mg | 80 mg | | | | | ↓ | ↓ | | | |
| ドンペリドン10mg | 3 錠 | 3 錠 | 経口 | 毎食前 | | ↑ | | | | | |
| デカドロン0.5mg | 16 錠 | 16 錠 | 経口 | 朝食後 | | | ↓ | ↓ | | | |
| メチコパール | 1 mg | 1 mg | im | | | ↑ | | | | | |
| パンビタン末 | 2 g | 2 g | 経口 | 朝食後 | | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |

メチコパールは9週毎に継続、パンビタンは毎日経口
投与7日前以前に開始、ペムレキセド最終投与から22日まで投与