

| レジメン名 | | 肺癌シスプラチン+アリムタ+アバスチン療法 | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------|-----------------------|------|---------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------|
| 略名 | | CDDP+PEM+Beva | | 1クールの日数 | | | | | | | | | | 21日 |
| 適応病名 | | 肺癌 | | 予定クール回数 | | | | | | | | | | 4~6回 |
| 薬品名 | 1日投与量 | 計算投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 7日前 | day 1 | day 2 | day 3 | day 4 | day 5 | day 6 | day 7 | day 21 | 実投与量 |
| 生理食塩液 | 100 mL | 100 mL | div | 15min | | ↑ | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 100-投与量 mL | 100 mL | div | 1.5hr | | ↓ | | | | | | | | |
| ベバシズマブ | 15 mg/kg | mg | | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 100 mL | 100 mL | div | 15min | | ↑ | | | | | | | | |
| ヒシナルク3号 | 500 mL | 500 mL | div | 2hr | | ↑ | | | | | | | | |
| パロノセトロン | 0.75 mg | 0.75 mg | | | | | | | | | | | | |
| デキサート | 6.6 mg | 6.6 mg | | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 500 mL | 500 mL | div | 2hr | | ↑ | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 500-投与量 mL | 500 mL | div | 2hr | | ↓ | | | | | | | | |
| シスプラチン | 75 mg/m2 | mg | | | | | | | | | | | | |
| ヒシナルク3号 | 500 mL | 500 mL | div | 2hr | | ↑ | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 100-投与量 mL | 100 mL | div | 15min | | ↓ | | | | | | | | |
| ペメトレキセド | 500 mg/m2 | mg | | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 500 mL | 500 mL | div | 2hr | | | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |
| ヒシナルク3号 | 500 mL | 500 mL | div | 2hr | | | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |
| ソリューゲンG | 500 mL | 500 mL | div | 2hr | | | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |
| ヒシナルク3号 | 500 mL | 500 mL | div | 2hr | | | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |
| メチコパール | 1 mg | 1 mg | im | | ↑ | | | | | | | | | |
| パンビタン末 | 1 g | 1 g | 経口 | 朝食後 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |

メチコパールは9週毎に継続、パンビタンは毎日経口

ベバシズマブは忍容性が良好であれば、2回目60分、3回目以降30分まで短縮可能