

レジメン名		CBDCA+PEM+Beva療法										
略名		CBDCA+PEM+Beva			1クールの日数					21日		
適応病名		非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)			予定クール回数					4回 その後PEM+Beva維持療法へ		
薬品名		1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	7日 前	day 1	day 2	day 3	day ...	day 21	実投与量
生理食塩液		100 mL	100 mL	div	keep		↑					
グラニセトロン デキサート		3mg/100mL 6.6 mg	3mg/100mL 6.6 mg	div	30分		↑					
ベバシズマブ 生理食塩液		15 mg/kg 100-投与量mL	mg 100 mL	div	30~90分		↓					
ペムトレキセド 生理食塩液		500 mg/m ² 100-投与量mL	mg 100 mL	div	10分		↓					
カルボプラチン 生理食塩液		AUC=6 250 mL	mg 250 mL	div	60分		↓					
アプレピタントカプセル		125 mg	125 mg	経口	PEM投与前		↑					
		80 mg	80 mg		午前		↑	↑				
メチコバル		1 mg	1 mg	im		↑						
パンビタン末		2 g	2 g	経口	朝食後	↑	↑	↑	↑	↑	↑	

* ペムトレキセド投与7日以上前から開始し最終投与から22日目まで以下を投与

メチコバルは9週毎、パンビタンは毎日経口投与

* ベバシズマブは忍容性が良好であれば、2回目60分、3回目以降30分まで短縮可能