

レジメン名														イピリムマブ+ニボルマブ+CBDCA+PEM療法	
略名		Ipi+Nivo+CBDCA+PEM(NSCLC)		1クールの日数										42日	
適応病名		非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)		予定クール回数					1クール施行後はIpi+Nivo維持療法へ						
薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	7日前	day 1	day 2	day 3	day 22	day 23	day 24	day 42	実投与量		
生理食塩液	100 mL	100 mL	div	keep		↑			↑						
オブジーボ	360 mg/body	360 mg/body	div	30分		↓			↓						
生理食塩液	64 mL	64 mL													
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	30分		↑									
ヤーボイ	1 mg/kg	mg	div	30分		↓									
生理食塩液	30 mL	30 mL													
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	30分		↑			↑						
グラニセトロン	3mg/100mL	3mg/100mL	div	30分		↑			↑						
デキサート	6.6 mg	6.6 mg													
ペムレキセド	500 mg/m2	mg	div	10分		↓			↓						
生理食塩液	100-投与量 mL	100 mL													
カルボプラチン	AUC=5	mg	div	60分		↓			↓						
生理食塩液	250 mL	250 mL													
アプレビタントカプセル	125 mg	125 mg	経口	ヤーボイ終了後 午前		↑			↑						
	80 mg	80 mg				↑	↑			↑	↑				
パンビタン末	1 g	1 g	経口	朝食後	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑		
メチコパール	1000 μg	1000 μg	im		↑										

パンビタン・メチコパールは投与7日以前に開始
 パンビタンは毎日服用しアリムタ最終投与から22日まで投与