

レジメン名													イピリムマブ+ニボルマブ+CBDCA+PTX療法
略名	Ipi+Nivo+CBDCA+PTX(NSCLC)		1クールの日数				42日						
適応病名	非小細胞肺癌(扁平上皮癌)		予定クール回数				1クール施行後はIpi+Nivo維持療法へ						
薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day	day	day	day	day	day	day	day	実投与量
					1	2	3	22	23	24	42		
生理食塩液	100 mL	100 mL	div	keep	↑				↑				
オブジーボ	360 mg/body	360 mg/body	div	30分	↓				↓				
生理食塩液	64 mL	64 mL	div	30分	↑								
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	30分	↑								
ヤーボイ	1 mg/kg	mg	div	30分	↓								
生理食塩液	30 mL	30 mL	div	30分	↓								
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	30分	↑				↑				
グラニセトロン	3mg/100mL	3mg/100mL	div	30分	↑				↑				
ファモチジン	20 mg	20 mg											
ポララミン	5 mg	5 mg	iv	ゆっくりと	↑				↑				
デキサート	13.2 mg	13.2 mg											
パクリタキセル	200 mg/m2	mg	div	180分	↓				↓				
生理食塩液	500 mL	500 mL	div	60分	↓				↓				
カルボプラチン	AUC=6	mg	div	60分	↓				↓				
5%ブドウ糖液	250 mL	250 mL	div	60分	↓				↓				
アプレピタントカプセル	125 mg	125 mg	経口	ヤーボイ終了後	↑				↑				
	80 mg	80 mg		午前		↑	↑			↑	↑		