

レジメン名														イビリムマブ+ニボルマブ+CDDP+PEM療法
略名		Ipi+Nivo+CDDP+PEM(NSCLC)			1クールの日数				42日					
適応病名		非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)			予定クール回数				1クール施行後は Ipi+Nivo維持療法へ					
薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	7日前	day 1	day 2	day 3	day 22	day 23	day 24	day 42	実投与量	
生理食塩液	100 mL	100 mL	div	keep		↑			↑					
オブジーボ	360 mg/body	360 mg/body	div	30分		↓			↓					
生理食塩液	64 mL	64 mL	div	30分		↑								
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	30分		↑								
ヤーボイ	1 mg/kg	mg	div	30分		↓								
生理食塩液	30 mL	30 mL	div	30分		↑			↑					
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	30分		↑								
グラニセロン	3mg/100mL	3mg/100mL	div	30分		↑			↑					
デキサート	6.6 mg	6.6 mg	div	30分		↑			↑					
ペメトレキセド	500 mg/m2	mg	div	10分		↓			↓					
生理食塩液	100-投与量 mL	100 mL	div	60分		↑			↑					
生理食塩液	500 mL	500 mL	div	60分		↑			↑					
KCL	10 meq	10 meq	div	60分		↑			↑					
硫酸マグネシウム	8 meq	8 meq	div	30分		↑			↑					
マンニトール	300 mL	300 mL	div	30分		↑			↑					
シスプラチン	75 mg/m2	mg	div	60分		↓			↓					
生理食塩液	500-投与量 mL	500 mL	div	60分		↑			↑					
デノサリン1	500 mL	500 mL	div	60分		↑			↑					
KCL	10 meq	10 meq	div	60分		↑			↑					
アプレピタントカプセル	125 mg	125 mg	経口	ヤーボイ終了後		↑			↑					
	80 mg	80 mg	経口	午前			↑	↑		↑	↑			
バンピタン末	1 g	1 g	経口	朝食後		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	
メチコパール	1000 μg	1000 μg	im			↑								

バンピタン・メチコパールは投与7日以前に開始

バンピタンは毎日内服しアリムタ最終投与から22日まで投与