

レジメン名	Pembrolizumab+CBDCA+nab-PTX													
略名	Pembrolizumab+CBDCA+nab-PTX		1クールの日数			21 日								
適応病名	非小細胞肺癌(扁平上皮癌)		予定クール回数			PDまで CBDCA・nabPTXは4クールで終了 キイトルーダは最大35クール								
薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day	day	day	day	day	day	day	day	day	実投与量
生理食塩液	100 mL	100 mL	div	keep	↑									
キイトルーダ	200 mg	200 mg	div	30分	↓									
生理食塩液	92 mL	92 mL												
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	フラッシュ用	↑				↑		↑			
パロノセトロン	0.75mg/50mL	0.75mg/50mL	div	15分	↑									
デキサート	6.6 mg	6.6 mg												
生理食塩液	100 mL	100 mL	div	30分					↑		↑			
デキサート	6.6 mg	6.6 mg												
アブラキサン (生理食塩液)	100 mg/m2 100mg当たり20mL)	mg 0 mL	div	30分	↓				↓		↓			
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	フラッシュ用	↑				↑		↑			
カルボプラチン	AUC=6	mg	div	1時間	↓									
5%ブドウ糖液	250 mL	250 mL												
アプレピタントカプセル	125 mg	125 mg	内服	ハロ/セトロン 開始時	↑									
	80 mg	80 mg		午前		↑	↑							