

| レジメン名       | Pembrolizumab+CBDCA+PEM |             |         |                |             |  |          |          |          |     |     |           |      |
|-------------|-------------------------|-------------|---------|----------------|-------------|--|----------|----------|----------|-----|-----|-----------|------|
| 略名          | Pembrolizumab+CBDCA+PEM |             | 1クールの日数 |                |             | 21日  |          |          |          |     |     |           |      |
| 適応病名        | 非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)          |             | 予定クール回数 |                |             | (下図参照)PDまで<br>ただし、CBDCAは最大4クール<br>キイトルーダは最大35クール |          |          |          |     |     |           |      |
| 薬品名         | 1日投与量                   | 計算投与量       | 投与方法    | 投与時間           | day<br>7日前  | day  | day<br>1 | day<br>2 | day<br>3 | day | day | day<br>21 | 実投与量 |
| 生理食塩液       | 100 mL                  | 100 mL      | div     | keep           |             |  | ↑        |          |          |     |     |           |      |
| キイトルーダ      | 200 mg                  | 200 mg      | div     | 30分            |             |  | ↓        |          |          |     |     |           |      |
| 生理食塩液       | 92 mL                   | 92 mL       |         |                |             |  |          |          |          |     |     |           |      |
| 生理食塩液       | 50 mL                   | 50 mL       | div     | フラッシュ用         |             |  | ↑        |          |          |     |     |           |      |
| パロノセトロン     | 0.75mg/50mL             | 0.75mg/50mL | div     | 15分            |             |  | ↑        |          |          |     |     |           |      |
| デキサート       | 6.6 mg                  | 6.6 mg      |         |                |             |  |          |          |          |     |     |           |      |
| ペメトレキセド     | 500 mg/m <sup>2</sup>   | mg          | div     | 10分            |             |  | ↓        |          |          |     |     |           |      |
| 生理食塩液       | 100-投与量 mL              | 100 mL      |         |                |             |  |          |          |          |     |     |           |      |
| カルボプラチン     | AUC=5                   | mg          | div     | 1時間            |             |  | ↓        |          |          |     |     |           |      |
| 5%ブドウ糖液     | 250 mL                  | 250 mL      |         |                |             |  |          |          |          |     |     |           |      |
| 生理食塩液       | 50 mL                   | 50 mL       | div     | 15分            |             |  | ↑        |          |          |     |     |           |      |
| アプレピタントカプセル | 125 mg                  | 125 mg      | 内服      | パロノセトロン<br>開始時 |             |  | ↑        |          |          |     |     |           |      |
|             | 80 mg                   | 80 mg       |         |                |             |  |          | ↑        |          |     |     |           |      |
| パンビタン末      | 1 g                     | 1 g         | 経口      | 朝食後            | ↑           | ↑  | ↑        | ↑        | ↑        | ↑   | ↑   | ↑         |      |
| メチコパール      | 1000 μg                 | 1000 μg     | im      |                | ↑ (9週ごとに継続) |  |          |          |          |     |     |           |      |

|         |              |
|---------|--------------|
| カルボプラチン | PDまで 最大4クール  |
| キイトルーダ  | PDまで 最大35クール |
| ペメトレキセド | PDまで 上限なし    |