

レジメン名	Pembrolizumab+CBDCA+PTX												
略名	Pembrolizumab+CBDCA+PTX			1クールの日数								21	日
適応病名	非小細胞肺癌(扁平上皮癌)			予定クール回数				PDまで CBDCA・PTXは4クールで終了 キイトルーダは最大35クール					
薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day 1	day 2	day 3	day	day	day	day	day 21	実投与量
生理食塩液	100 mL	100 mL	div	keep	↑								
キイトルーダ	200 mg	200 mg	div	30分	↓								
生理食塩液	92 mL	92 mL											
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	フラッシュ用	↑								
パロノセトロン	0.75mg/50mL	0.75mg/50mL	div	15分	↑								
ファモチジン	20 mg	20 mg	iv	ゆっくりと	↑								
ポラミン	5 mg	5 mg											
デキサート	13.2 mg	13.2 mg											
パクリタキセル	200 mg/m2	mg	div	2時間	↓								
5%ブドウ糖液	500 mL	500 mL											
カルボプラチン	AUC=6	mg	div	1時間	↓								
5%ブドウ糖液	250 mL	250 mL											
アプレピタントカプセル	125 mg	125 mg	内服	パロノセトロン 開始時 午前	↑								
	80 mg	80 mg				↑	↑						