

レジメン名	Pembrolizumab+CDDP(75)+PEM												
略名	Pembrolizumab+CDDP(75)+PEM		1クールの日数			21 日							
適応病名	非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)		予定クール回数			(下図参照)PDまで ただし、CDDPは最大4クール キイトルーダは最大35クール							
薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day 7日前	day	day 1	day 2	day 3	day	day	day 21	実投与量
生理食塩液	100 mL	100 mL	div	keep			↑						
キイトルーダ	200 mg	200 mg	div	30分			↓						
生理食塩液	92 mL	92 mL											
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	フラッシュ用			↑						
パロノセトロン	0.75mg/50mL	0.75mg/50mL	div	15分			↑						
デキサート	6.6 mg	6.6 mg											
ペメトレキセド	500 mg/m2	mg	div	10分			↓						
生理食塩液	100-投与量 mL	100 mL											
生理食塩液	500 mL	500 mL	div	1時間			↑						
KCL	10 meq	10 meq											
硫酸マグネシウム	8 meq	8 meq											
マンニトール	200 mL	200 mL	div	30分			↑						
シスプラチン	75 mg/m2	mg	div	1時間			↓						
生理食塩液	500-投与量 mL	500 mL											
デノサリン1	500 mL	500 mL	div	1時間			↑						
KCL	10 meq	10 meq											
アプレピタントカプセル	125 mg	125 mg	内服	パロノセトロン 開始時 午前			↑						
	80 mg	80 mg							↑	↑			
パンビタン末	1 g	1 g	経口	朝食後	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	
メチコバール	1000 μg	1000 μg	im		↑ (9週ごとに継続)								

シスプラチン	PDまで 最大4クール
キイトルーダ	PDまで 最大35クール
ペメトレキセド	PDまで 上限なし