

レジメン名	乳癌パージェタ+ハーセプチン+エリブリン療法											
略名	pertuzumab+HER+eribulin			1クールの日数				21日				
適応病名	タキサン系、ピノレルピンに対し耐性となった HER2陽性の手術不能又は再発乳癌			予定クール回数				PDまで				
				所要時間				3-4時間				
薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day	day	day	day	day	day	day	実投与量
生理食塩液	500 mL	500 mL	div	keep	↑							
パージェタ	420 mg	420 mg	div	30-60min	↓							
生理食塩液	250 mL	250 mL										
30分間経過観察												
トラスツズマブ	6 mg/kg	mg	div	30-60min	↓							
生理食塩液	250 mL	250 mL										
30分間経過観察												
グラニセトロン	3mg/100mL	3mg/100mL	div	15min	↑					↑		
デキサート	3.3 mg	3.3 mg										
ハラヴェン	1.4 mg/m ²	mg	iv	2~5 min	↓					↓		
生理食塩液	20 mL	20 mL										

(初回のみ)

薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day	実投与量						
					1	2	3	...	8	...	21	
生理食塩液	500 mL	500 mL	div	keep	↑							
パージェタ	840 mg	840 mg	div	60-90min	↓							
生理食塩液	250 mL	250 mL										
60分間経過観察												
トラスツズマブ	8 mg/kg	mg	div	90-120min	↓							
生理食塩液	250 mL	250 mL										
60分間経過観察												
グラニセトロン	3mg/100mL	3mg/100mL	div	15min	↑					↑		
デキサート	3.3 mg	3.3 mg										
ハラヴェン	1.4 mg/m ²	mg	iv	2~5 min	↓					↓		
生理食塩液	20 mL	20 mL										

※ただし、初回はday2にハラヴェンまたはday2にハラヴェン+トラスツズマブでも可