

レジメン名		乳癌パージェタ+ハーセプチン+パクリタキセル療法												
略名		pertuzumab+HER+PTX			1クールの日数			21日						
適応病名		HER2陽性の手術不能又は再発乳癌			予定クール回数			PDまで						
薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day	day	day	day	day	day	day	day	day	実投与量
					1	2	3	...	8	...	15	...	21	
生理食塩液	500 mL	500 mL	div	keep	↑									
パージェタ	420 mg	420 mg	div	30-60min	↓									
生理食塩液	250 mL	250 mL												
30分間経過観察														
トラスツズマブ	6 mg/kg	mg	div	30-60min	↓									
生理食塩液	250 mL	250 mL												
30分間経過観察														
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	keep					↑		↑			
デキサート	3.3~9.9 mg	3.3~9.9 mg	iv	ゆっくり	↑				↑		↑			
ファモチジン	20 mg	20 mg	PTX投与 30分前											
ポララミン	5 mg	5 mg												
パクリタキセル	80 mg/m <sup>2</sup>	mg	div	60-120min	↓				↓		↓			
5%ブドウ糖液	250 mL	250 mL												

(初回のみ)

薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day	day	day	day	day	day	day	day	day	実投与量
					1	2	3	...	8	...	15	...	21	
生理食塩液	500 mL	500 mL	div	keep	↑									
パージェタ	840 mg	840 mg	div	60-90min	↓									
生理食塩液	250 mL	250 mL												
60分間経過観察														
トラスツズマブ	8 mg/kg	mg	div	90-120min	↓									
生理食塩液	250 mL	250 mL												
60分間経過観察														
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	keep					↑		↑			
デキサート	3.3~9.9 mg	3.3~9.9 mg	iv	ゆっくり	↑				↑		↑			
ファモチジン	20 mg	20 mg	PTX投与 30分前											
ポララミン	5 mg	5 mg												
パクリタキセル	80 mg/m <sup>2</sup>	mg	div	60-120min	↓				↓		↓			
5%ブドウ糖液	250 mL	250 mL												

※ただし、初回はday2にパクリタキセルまたはday2にパクリタキセル+トラスツズマブでも可