

レジメン名	Pembrolizumab+GEM+CBDCA		
略名	Pemb+GEM+CBDCA	1クールの日数	21または42日
適応病名	乳癌 HER(-),PR(-),ER(-),PD-L1(+)	予定クール回数	PDまで

キイトルーダ3週投与の場合

薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day	day	day	day	day	day	実投与量
					1			8		21	
生理食塩液	100 mL	100 mL	div	keep	↑			↑			
キイトルーダ	200 mg	200 mg	div	30分	↓						
生理食塩液	100-投与量 mL	92 mL									
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	フラッシュ用	↑						
デキサート	6.6 mg	6.6 mg	div	30分	↑			↑			
グラニセトロン	3mg/100mL	3mg/100mL									
ゲムシタビン	1000 mg/m2	mg	div	30分	↓			↓			
生理食塩液	100mL	100mL									
カルボプラチン	AUC= 2	mg	div	60分	↓			↓			
生理食塩液	250mL	250mL									

キイトルーダ6週投与の場合

薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day	day	day	day	day	day	day	day	day	day	day	day	実投与量
					1			8		22		29		42			
生理食塩液	100 mL	100 mL	div	keep	↑			↑			↑			↑			
キイトルーダ	400 mg	400 mg	div	30分	↓												
生理食塩液	100-投与量 mL	84 mL															
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	フラッシュ用	↑												
デキサート	6.6 mg	6.6 mg	div	30分	↑			↑			↑			↑			
グラニセトロン	3mg/100mL	3mg/100mL															
ゲムシタビン	1000 mg/m2	mg	div	30分	↓			↓			↓			↓			
生理食塩液	100mL	100mL															
カルボプラチン	AUC= 2	mg	div	60分	↓			↓			↓			↓			
生理食塩液	250mL	250mL															

嘔気症状強い場合には、アプレピタントカプセルの使用を考慮する