

レジメン名	Pembrolizumab+nab-PTX		
略名	Pemb+nab-PTX	1クールの日数	84日
適応病名	乳癌 HER(-),PR(-),ER(-),PD-L1(+)	予定クール回数	PDまで

キイトルーダ3週投与の場合

薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day	実投与量										
					1	8	15	22	29	36	43	50	57	64	71	
生理食塩液	100 mL	100 mL	div	keep	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	
キイトルーダ	200 mg	200 mg	div	30分	↓			↓			↓			↓		
生理食塩液	100-投与量 mL	92 mL														
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	フラッシュ用	↑			↑			↑			↑		
グラニセトロン	3mg/100mL	3mg/100mL	div	30分	↑	↑	↑		↑	↑	↑		↑	↑	↑	
アブラキサン (生理食塩液	100 mg/m2 100mg当たり20mL)	mg 0 mL	div	30分	↓	↓	↓		↓	↓	↓		↓	↓	↓	
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	フラッシュ用	↑	↑	↑		↑	↑	↑		↑	↑	↑	

キイトルーダ6週投与の場合

薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day	実投与量										
					1	8	15	22	29	36	43	50	57	64	71	
生理食塩液	100 mL	100 mL	div	keep	↑	↑	↑		↑	↑	↑		↑	↑	↑	
キイトルーダ	400 mg	400 mg	div	30分	↓						↓					
生理食塩液	100-投与量 mL	84 mL														
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	フラッシュ用	↑						↑					
グラニセトロン	3mg/100mL	3mg/100mL	div	30分	↑	↑	↑		↑	↑	↑		↑	↑	↑	
アブラキサン (生理食塩液	100 mg/m2 100mg当たり20mL)	mg 0 mL	div	30分	↓	↓	↓		↓	↓	↓		↓	↓	↓	
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	フラッシュ用	↑	↑	↑		↑	↑	↑		↑	↑	↑	