レジメン管理番号:04-16-16

レジメン名	Pembrolizumab+PTX		
略名	Pemb+PTX	1クールの日数	84日
適応病名	乳癌,HER(−),PR(−),ER(−),PD-L1(+)	予定クール回数	PDまで

キイトルーダ3週投与の場合

薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day 1	day 8	day 15	day 22	day 29	day 36	day 43	day 50	day 57	day 64	day 71	day 84	実投与量
生理食塩液	100 mL	100 mL	div	keep	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑		↑	↑	↑		
キイトルーダ 生理食塩液	200 mg 100−投与量 mL	200 mg 92 mL	div	30分	↓			↓			↓			↓			
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	フラッシュ用	↑			↑			↑			↑			
ファモチジン ポララミン デキサート	20 mg 5 mg 6.6 mg	20 mg 5 mg 6.6 mg	iv	ゆっくりと	↑	↑	↑		↑	↑	↑		↑	↑	↑		
パクリタキセル 生理食塩液	90 mg/m2 250 mL	mg 250 mL	div	60分	↓	↓	↓		↓	↓	↓		↓	↓	↓		

キイトルーダ6週投与の場合

薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day 1	day 8	day 15	day 22	day 29	day 36	day 43	day 50	day 57	day 64	day 71	day 84	実投与量
生理食塩液	100 mL	100 mL	div	keep	↑	↑	↑		↑	↑	↑		↑	↑	↑		
キイトルーダ 生理食塩液	400 mg 100−投与量 mL	400 mg 84 mL	div	30分	↓						↓						
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	フラッシュ用	↑						↑						
ファモチジン ポララミン デキサート	20 mg 5 mg 6.6 mg	20 mg 5 mg 6.6 mg	iv	ゆっくりと	↑	↑	↑		↑	↑	↑		↑	↑	↑		
パクリタキセル 生理食塩液	90 mg/m2 250 mL	mg 250 mL	div	60分	↓	↓	↓		↓	↓	↓		↓	↓	↓		