

レジメン名	術前化学療法①Pembrolizumab+CBDCA+PTX		
略名	Pembrolizumab+CBDCA+PTX	1クールの日数	21日
適応病名	乳癌	予定クール回数	4回施行後、術前化学療法②へ

カルボプラチン毎週投与の場合

薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day	day	day	day	day	day	day	day	day	day	実投与量
					1			8			15			21	
生理食塩液	100 mL	100 mL	div	keep	↑			↑			↑				
キイトルーダ	200 mg	200 mg	div	30分	↓										
生理食塩液	100-投与量 mL	92 mL													
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	フラッシュ用	↑										
グラニセトロン	3mg/100mL	3mg/100mL	div	30分	↑			↑			↑				
ファモチジン	20 mg	20 mg													
ポララミン	5 mg	5 mg	iv	ゆっくりと	↑			↑			↑				
デキサート	6.6~9.9 mg	6.6~9.9 mg													
パクリタキセル	80 mg/m2	mg	div	1時間	↓			↓			↓				
生理食塩液	250 mL	250 mL													
カルボプラチン	AUC=1.5	mg	div	1時間	↓			↓			↓				
生理食塩液	250 mL	250 mL													(最大225mg)

カルボプラチン3週投与の場合

薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day	day	day	day	day	day	day	day	day	day	実投与量
					1	2	3		8			15			
生理食塩液	100 mL	100 mL	div	keep	↑				↑			↑			
キイトルーダ	200 mg	200 mg	div	30分	↓										
生理食塩液	100-投与量 mL	92 mL													
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	フラッシュ用	↑										
パロノセトロン	0.75mg/50mL	0.75mg/50mL	div	30分	↑										
ファモチジン	20 mg	20 mg													
ポララミン	5 mg	5 mg	iv	ゆっくりと	↑			↑			↑				
デキサート	6.6~9.9 mg	6.6~9.9 mg													
パクリタキセル	80 mg/m2	mg	div	1時間	↓			↓			↓				
生理食塩液	250 mL	250 mL													
カルボプラチン	AUC=5	mg	div	1時間	↓										
生理食塩液	250 mL	250 mL													(最大750mg)
アプレピタントカプセル	125 mg	125 mg	内服	キイトルーダ開始時 午前	↑										
	80 mg	80 mg					↑	↑							

\* キイトルーダは400mgを6週間に1回投与も可能

術前薬物療法期		手術	術後薬物療法期
治療1 キイトルーダ® +パクリタキセル +カルボプラチン	治療2 キイトルーダ® +AC又はEC		