

レジメン名	術前化学療法②Pembrolizumab+EC											
略名	Pembrolizumab+EC			1クールの日数				21日				
適応病名	乳癌			予定クール回数				4回				
薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day 1	day	day	day	day	day	day 21	実投与量
生理食塩液	100 mL	100 mL	div	keep	↑							
キイトルーダ	200 mg	200 mg	div	30分	↓							
生理食塩液	100-投与量 mL	92 mL										
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	フラッシュ用	↑							
パロノセトロン	0.75 mg/50mL	0.75 mg	div	15分	↑							
デキサート	9.9 mg	9.9 mg										
エピルピシン	90 mg/m2	mg	div	10分	↓							
5%ブドウ糖液	100 mL	100 mL										
エンドキサン	600 mg/m2	mg	div	30分	↓							
生理食塩液	250 mL	250 mL										
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	フラッシュ用	↑							

\* キイトルーダは400mgを6週間に1回投与も可能

術前薬物療法期		手術	術後薬物療法期
治療1 キイトルーダ® +パクリタキセル +カルボプラチン	治療2 キイトルーダ® +AC又はEC		キイトルーダ®単剤*