レジメン管理番号:04-16-25

レジメン名	乳癌ペルツズマブ・トラスツズマブ(sc)+ドセタキセル療法									
略名	pertuzumab・Trastuzumab(sc)+DOC		1クールの日数						21 日	
適応病名	乳癌		予定クール回数						4 回	
薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day 1	day 2	day 3	day ・・・	day 21	実投与量
生理食塩液	500 mL	500 mL	div	keep	↑					
ペルツズマブ・トラスツズマブ配合皮下注【MA】	10 mL	10 mL	sc	5分	↓					
15分間経過観察										
グラニセトロン デキサート	3mg/100mL 6.6 mg	3mg/100mL 6.6 mg	div	15分	↑					
ドセタキセル 5%ブドウ糖液	75 mg/m2 250 mL	mg 250 mL	div	90分	↓					
デカドロン	8 mg	8 mg	po	1日2回	夕	朝夕	朝			

(初回のみ)

薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day 1	day 2	day 3	day ・・・	day 21	実投与量
生理食塩液	500 mL	500 mL	div	keep	↑					
ペルツズマブ・トラスツズマブ配合皮下注【IN】	15 mL	15 mL	sc	8分	↓					
30分間経過観察										
グラニセトロン デキサート	3mg/100mL 6.6 mg	3mg/100mL 6.6 mg	div	15分	↑					
ドセタキセル 5%ブドウ糖液	75 mg/m2 250 mL	mg 250 mL	div	90分	↓					
デカドロン	8 mg	8 mg	po	1日2回	夕	朝夕	朝			

・BMI＜18.5、BMI≧30の方には使用しない方が望ましい可能性がある(臨床試験サブグループ解析の結果より)