レジメン管理番号:04-16-27

レジメン名	乳癌 ペルツズマブ・トラスツズマブ(sc)+パクリタキセル療法													
略名	pertuzumab・trastuzumab(sc)+PTX		1クールの日数											21 日
適応病名	乳癌		予定クール回数											4 回

薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day 1	day 2	day 3	day ・・・	day 8	day ・・・	day 15	day ・・・	day 21	実投与量
生理食塩液	100 mL	100 mL	div	keep	↑									
ペルツズマブ・トラスツズマブ配合皮下注【MA】	10 mL	10 mL	sc	5分	↓									
15分間経過観察														
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	keep					↑		↑			
デキサート	3.3～9.9 mg	3.3～9.9 mg	iv PTX投与30分前	ゆっくり	↑				↑		↑			
ファモチジン	20 mg	20 mg												
ポララミン	5 mg	5 mg												
パクリタキセル	80 mg/m2	mg	div	60分	↓				↓		↓			
5%ブドウ糖液	250 mL	250 mL												

(初回のみ)

薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day 1	day 2	day 3	day ・・・	day 8	day ・・・	day 15	day ・・・	day 21	実投与量
生理食塩液	100 mL	100 mL	div	keep	↑									
ペルツズマブ・トラスツズマブ配合皮下注【IN】	15 mL	15 mL	sc	8分	↓									
30分間経過観察														
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	keep					↑		↑			
デキサート	3.3～9.9 mg	3.3～9.9 mg	iv PTX投与30分前	ゆっくり	↑				↑		↑			
ファモチジン	20 mg	20 mg												
ポララミン	5 mg	5 mg												
パクリタキセル	80 mg/m2	mg	div	60分	↓				↓		↓			
5%ブドウ糖液	250 mL	250 mL												

・BMI＜18.5、BMI≧30の方には使用しない方が望ましい可能性がある(臨床試験サブグループ解析の結果より)