レジメン管理番号:04-16-29

レジメン名	乳癌 ペルツズマブ・トラスツズマブ(sc)+エリブリン療法													
略名	pertuzumab・trastuzumab(sc)+eribulin		1クールの日数		21 日									
適応病名	乳癌		予定クール回数		PDまで									

薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day 1	day 2	day 3	day ・・・	day 8	day ・・・	day 15	day ・・・	day 21	実投与量
生理食塩液	100 mL	100 mL	div	keep	↑									
ペルツズマブ・トラスツズマブ配合皮下注【MA】	10 mL	10 mL	sc	5分	↓									
15分間経過観察														
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	keep					↑					
グラニセトロン デキサート注	3mg/100mL 3.3 mg	3mg/100mL 3.3 mg	div	15分	↑				↑					
エリブリン 生理食塩液	1.4 mg/m2 50 mL	mg 50 mL	div	2～5分	↓				↓					

(初回のみ)

薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day 1	day 2	day 3	day ・・・	day 8	day ・・・	day 15	day ・・・	day 21	実投与量
生理食塩液	100 mL	100 mL	div	keep	↑									
ペルツズマブ・トラスツズマブ配合皮下注【IN】	15 mL	15 mL	sc	8分	↓									
30分間経過観察														
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	keep					↑					
グラニセトロン デキサート注	3mg/100mL 3.3 mg	3mg/100mL 3.3 mg	div	15分	↑				↑					
エリブリン 生理食塩液	1.4 mg/m2 50 mL	mg 50 mL	div	2～5分	↓				↓					

・BMI＜18.5、BMI≧30の方には使用しない方が望ましい可能性がある(臨床試験サブグループ解析の結果より)