

| レジメン名 | 胃癌LV+5-FU(RPMI)療法 | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------|-------------------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|------|
| 略名 | LV+5-FU | 1クールの日数 | | | | | | | | | | 56日 | |
| 適応病名 | 胃癌LV+5-FU(RPMI)療法 | | | | | | | | | | 予定クール回数 | | 回 |
| 薬品名 | 1日投与量 | 計算投与量 | 投与方法 | 投与時間 | day 1 | day 8 | day 15 | day 22 | day 29 | day 36 | day | day 56 | 実投与量 |
| 生理食塩液 | 50 mL | 50 mL | div | keep | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | | | |
| グラニセトロン デキサート | 3mg/100mL 3.3~6.6 mg | 3mg/100mL 3.3~6.6 mg | div | 30min | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | | | |
| レボホリナート | 250 mg/m2 | mg | div | 2hr | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | |
| 5%ブドウ糖液 | 500 mL | 500 mL | | | | | | | | | | | |
| 5-FU(bolus) | 600 mg/m2 | mg | div | 3min | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 50 mL | | | | | | | | | | | |

5-FUはレボホリナート開始1時間後に投与