

レジメン名	胃癌XELOX+HER療法										
略名	XELOX+HER		1クールの日数			21日					
適応病名	胃癌		予定クール回数			PDまで					
薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day 1	day ~	day 14	day	day	day 21	実投与量
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	keep	↑						
トラスツズマブ	6 mg/kg	mg	div	30分~	↓						
生理食塩液	250 mL	250 mL		1時間							
5%ブドウ糖液	50 mL	50 mL	div	keep	↑						
グラニセトロン	3mg/100mL	3mg/100mL	div	30分	↑						
デキサート	6.6 mg	6.6 mg									
オキサリプラチン	130 mg/m2	mg	div	2時間	↓						
5%ブドウ糖液	250 mL	250 mL									
カペシタビン	2000 mg/m2	mg	経口	2×1	↓	↓	↓				

(初回のみ)

トラスツズマブ	8 mg/kg	mg	div	1.5時間	↓						
生理食塩液	250 mL	250 mL									

トラスツズマブは初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。

BSAによる
カペシタビン用量目安

体表面積	1回用量
1.36m2未満	1,200mg
1.36m2以上1.66m2未満	1,500mg
1.66m2以上1.96m2未満	1,800mg
1.96m2以上	2,100mg