レジメン名	胃癌 XELOX+Zolbetuximab療法														
略名	XELOX+Zolbetuximab		1クールの日数												21 日
適応病名	胃癌、食道胃接合部癌		予定クール回数												PDまで I-OHP 8クールまで

薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day 1	day 2	day 3	day 4	day 5	day ～	day 14	day 15	day ～	day 21	実投与量
生理食塩液	100 mL	100 mL	div	keep	↑										
パロノセトロン ホスネツピタント デキサメタゾン	0.75mg/50mL 235mg/10mL 9..9 mg	0.75mg/50mL 235mg/10mL 9.9 mg	div	30分	↑										
デキサメタゾン	8 mg	8 mg	内服	1日1～2回		↑	↑	↑	(↑)						
ゾルベツキシマブ 注射用水 生理食塩液	600 mg/㎡ 1Vあたり5mLで溶解 2.0mg/mLとなるよう希釈	mg 1Vあたり5mLで溶解 0 mL	div	2時間以上	↓										
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	フラッシュ用	↑										
5%ブドウ糖液	250 mL	250 mL	div	keep	↑										
オキサリプラチン 5%ブドウ糖液	130 mg/㎡ 250 mL	mg 250 mL	div	2時間	↓										
カペシタビン	下表参照	下表参照	経口	朝・夕	↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓			
または															
カペシタビン	下表参照	下表参照	経口	朝・夕		↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓			

（初回のみ）

ゾルベツキシマブ 注射用水 生理食塩液	800 mg/㎡ 1Vあたり5mLで溶解 2.0mg/mLとなるよう希釈	mg 1Vあたり5mLで溶解 0 mL	div	2時間以上	↓										

カペシタビン投与量

BSA1.36㎡未満	2400mg/day(分2)
BSA1.36㎡以上1.66㎡未満	3000mg/day(分2)
BSA1.66㎡以上1.96㎡未満	3600mg/day(分2)
BSA1.96㎡以上	4200mg/day(分2)