レジメン名	胃癌XELOX+Pembrolizumab療法											
略名	XELOX+Pembrolizumab		1クールの日数									21日
適応病名	胃癌、食道胃接合部癌		予定クール回数									PDまで オキサリプラチン6サイクルまで ペムブロリズマブ35サイクル(約2年)まで

薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day 1	day 2	day ～	day 14	day 15	day ～	day 21	実投与量
生理食塩液	100 mL	100 mL	div	keep	↑							
ペムブロリズマブ＊	200 mg	200 mg	div	30分	↓							
生理食塩液	100-投与量 mL	100 mL										
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	フラッシュ用	↑							
5%ブドウ糖液	250 mL	250 mL	div	keep	↑							
パロノセトロン	0.75mg/50mL	0.75mg/50mL	div	30分	↑							
デキサート	6.6 mg	6.6 mg										
オキサリプラチン	130 mg/m2	mg	div	2時間	↓							
5%ブドウ糖液	250 mL	250 mL										
カペシタビン	下表参照	下表参照	経口	朝・夕	↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓			
または												
カペシタビン	下表参照	下表参照	経口	朝・夕		↓↓	↓↓	↓↓	↓↓			

＊ペムブロリズマブは1回400mgを6週間間隔で投与も可

カペシタビン投与量

BSA1.36㎡未満	2400mg/day(分2)
BSA1.36㎡以上1.66㎡未満	3000mg/day(分2)
BSA1.66㎡以上1.96㎡未満	3600mg/day(分2)
BSA1.96㎡以上	4200mg/day(分2)