

レジメン名		Encorafenib+Binimetinib+Cetuximab療法													
略名		BEACON(3剤併用)		1クールの日数				28 日							
適応病名		大腸癌		予定クール回数				PDまで							
薬品名		1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day 1	day ...	day 8	day ...	day 15	day ...	day 22	day ...	day 28	実投与量
ビラフトビカプセル		300mgを1日1回	300mgを1日1回	経口		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
メクトビ錠		1回45mgを1日2回	1回45mgを1日2回	経口		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
レスタミン錠10mg		5 錠	5 錠	経口	30分前	↑		↑		↑		↑			
生理食塩液		100 mL	100 mL	div	30分	↑		↑		↑		↑			
デキサート		3.3～6.6 mg	3.3～6.6 mg												
アービタックス		250 mg/m2	mg	div	1時間	↓		↓		↓		↓			
生理食塩液		250-投与量mL	250 mL												
生理食塩液		250 mL	250 mL	div	1時間	↑		↑		↑		↑			
初回のみ															
アービタックス		400 mg/m2	mg	div	2時間	↓									
生理食塩液		500-投与量mL	500 mL												
アービタックス投与終了後経過観察1時間															