

レジメン名		Bev+FOLFOXIRI療法						
略名		Bev+FOLFOXIRI			1クールの日数			14日
適応病名		大腸癌			予定クール回数			12クール(維持療法へ移行)
薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day 1	day 2	day 14	実投与量
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	keep	↑			
グラニセトロン デキサート	3mg/100mL 6.6 mg	3mg/100mL 6.6 mg	div	30分	↑			
ペバシズマブ 生理食塩液	5 mg/kg 100-投与量 mL	mg 100 mL	div	30-90分	↓			
5%ブドウ糖液	500 mL	500 mL	div	keep	↑	↑		
イリノテカン 5%ブドウ糖液	165 mg/m2 250 mL	mg 250 mL	div	1時間	↓			
オキサリプラチン 5%ブドウ糖液	85 mg/m2 250 mL	mg 250 mL	div	2時間	↓			
レボホリナート 5%ブドウ糖液	200 mg/m2 250 mL	mg 250 mL	div	2時間	↓			
5-FU(ci) 生理食塩液	3200 mg/m2 500-投与量 mL	mg 500 mL	div	48時間	↓			

ペバシズマブの初回投与時は90分かけて点滴静注。

2回目以降は、忍容性に応じて60分、30分とすることが可能。