

| レジメン名 | 大腸癌ベバシズマブ5+FOLFIRI療法 | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|------|--------------|-------|--------|---------------------------|
| 略名 | Bev5+FOLFIRI | | | | | | 14 日 |
| 適応病名 | 大腸癌 | | | | | | 予定クール回数 PD or 副作用で不可まで |
| 薬品名 | 1日投与量 | 計算投与量 | 投与方法 | 投与時間 | day 1 | day 14 | 実投与量 |
| ベバシズマブ 生理食塩液 | 5 mg/kg 100-投与量 mL | mg 100 mL | div | 30~ 90min | ↓ | | |
| グラニセトロン デキサート | 3mg/100mL 6.6 mg | 3mg/100mL 6.6 mg | div | 30min | ↑ | | |
| イリノテカン 5%ブドウ糖液 | 150 mg/m2 250 mL | mg 250 mL | div | 1.5hr | ↓ | | |
| レボホリナート 5%ブドウ糖液 | 200 mg/m2 250 mL | mg 250 mL | div | 2hr | ↓ | | |
| 5-FU(bolus) 生理食塩液 | 400 mg/m2 50 mL | mg 50 mL | div | 3min | ↓ | | |
| 5-FU(ci) 生理食塩液 | 2400 mg/m2 (自動計算) mL | mg 0 mL | div | 46hr | ↓ | | |

ベバシズマブの初回投与時は90分かけて点滴静注。

2回目以降は、忍容性に応じて60分、30分とすることが可能。