

レジメン名	大腸癌 Bev5+IRIS療法										
略名	Bev5+IRIS			1クールの日数						28日	
適応病名	大腸癌			予定クール回数						PDまで	
薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day 1	day ~	day 14	day 15	day ...	day 28	実投与量
生理食塩液	50 mL	100 mL	div	keep	↑			↑			
グラニセトロン デキサート	3mg/100mL 6.6 mg	3 mg 6.6 mg	div	30min	↑			↑			
ペバシズマブ 生理食塩液	5 mg/kg 100-投与量 mL	mg 100 mL	div	30~ 90min	↓			↓			
イリノテカン 生理食塩液	100 mg/m2 250 mL	mg 250 mL	div	90min	↓			↓			
S-1	下表参照		経口	朝・夕	↓	↓	↓				

ペバシズマブの初回投与時は90分かけて点滴静注。

2回目以降は、忍容性に応じて60分、30分とすることが可能。

S-1投与量	
BSA1.25㎡未満	80mg/day(分2)
BSA1.25㎡以上1.50㎡未満	100mg/day(分2)
BSA1.50㎡以上	120mg/day(分2)
※ただし、CCr(Cockcroft Gault式)≥50、<80(mL/min)の場合1段階減量	
CCr<50(mL/min)の場合投与不可	