

レジメン名	大腸癌ベバシズマブ5+mFOLFOX6療法(外来)								
略名	Bev5+m FOLFOX6(外来)		1クールの日数				14日		
適応病名	大腸癌		予定クール回数				PD or 副作用で不可まで		
薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day 1	day	day	day 14	実投与量
生理食塩液	100 mL	100 mL	div	2hr	↓				
グラニセロン	3mg/100mL	3mg/100mL	div	30min	↑				
デキサート	6.6 mg	6.6 mg							
ベバシズマブ	5 mg/kg	mg	div	30~	↓				
生理食塩液	100-投与量 mL	100 mL		90min					
5%ブドウ糖液	100 mL	100 mL	div	keep	↓				
オキサリプラチン	85 mg/m2	mg	div	2hr	↓				
5%ブドウ糖液	250 mL	250 mL							
レボホリナート	200 mg/m2	mg	div	2hr	↓				
5%ブドウ糖液	250 mL	250 mL							
5-FU(bolus)	400 mg/m2	mg	div	全開	↓				
生理食塩液	50 mL	50 mL							
5-FU(ci)	2400 mg/m2	mg	div	46hr	↓				
生理食塩液	(自動計算) mL	0 mL							

ベバシズマブの初回投与時は90分かけて点滴静注。
 2回目以降は、忍容性に応じて60分、30分とすることが可能。