

レジメン名	大腸癌セツキシマブ+FOLFIRI療法(外来)(q2w)										
略名	CET+FOLFIRI(外来)(q2w)			1クールの日数					14日		
適応病名	治癒切除不能な進行再発大腸癌(KRAS wild)			予定クール回数					PDまで		
薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day 1	day	day	day	day	day 14	実投与量
レスタミン錠10mg	5錠	5錠	経口	30分前	↑						
グラニセロン	3mg/100mL	3mg/100mL	div	30分	↑						
デキサート	6.6 mg	6.6 mg									
アービタックス	500 mg/m2	mg	div	1-2時間	↓						
生理食塩液	500-投与量mL	500 mL									
生理食塩液	250 mL	250 mL	div	1時間	↑						
5%ブドウ糖液	50 mL	50 mL	div	keep	↑						
イリノテカン	180 mg/m2	mg	div	90分	↓						
(参考 イリノテカン)	150 mg/m2	mg									
5%ブドウ糖液	250 mL	250 mL									
レボホリナート	200 mg/m2	mg	div	2時間	↓						
5%ブドウ糖液	250 mL	250 mL									
5-FU(bolus)	400 mg/m2	mg	div	3分	↓						
生理食塩液	50 mL	50 mL									
5-FU(ci)	2400 mg/m2	mg	div	46時間	↓						
生理食塩液	(自動計算) mL	0 mL									

アービタックス投与終了後経過観察1時間

アービタックスの投与速度は初回2時間 2回目1.5時間 3回目以降1時間かけて投与する
 イリノテカンの国内承認用量上限は150mg/m2のため参考情報として併記しています。