

レジメン名	大腸癌セツキシマブ+FOLFIRI療法(外来)(q2w)									
略名	CET+FOLFIRI(外来)(q2w)			1クールの日数		14 日				
適応病名	治癒切除不能な進行再発大腸癌(KRAS wild)			予定クール回数		PDまで				
薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day	day	day	day	day	実投与量
レスタミン錠10mg	5錠	5錠	経口	30分前	↑				14	
グラニセトロン	3mg/100mL	3mg/100mL	div	30分	↑					
デキサート	6.6 mg	6.6 mg								
アービタックス	500 mg/m2	mg	div	1-2時間	↓					
生理食塩液	500-投与量mL	500 mL								
生理食塩液	250 mL	250 mL	div	1時間	↑					
5%ブドウ糖液	50 mL	50 mL	div	keep	↑					
イリノテカン	180 mg/m2	mg	div	90分	↓					
(参考 イリノテカン)	150 mg/m2	mg								
5%ブドウ糖液	250 mL	250 mL								
レボホリナート	200 mg/m2	mg	div	2時間	↓					
5%ブドウ糖液	250 mL	250 mL								
5-FU(bolus)	400 mg/m2	mg	div	3分	↓					
生理食塩液	50 mL	50 mL								
5-FU(ci)	2400 mg/m2	mg	div	46時間	↓					
生理食塩液	(自動計算) mL	0 mL								

アービタックス投与終了後経過観察1時間

アービタックスの投与速度は初回2時間 2回目1.5時間 3回目以降1時間かけて投与する
イリノテカンの国内承認用量上限は150mg/m2のため参考情報として併記しています。