

レジメン名	大腸癌セツキシマブ+mFOLFOX6療法(外来)									
略名	CET+mFOLFOX6(外来)			1クールの日数					14日	
適応病名	大腸癌			予定クール回数					PD or 副作用で不可まで	
薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day 1	day 8	day 14	実投与量		
レスタミン錠10mg	5錠	5錠	経口	30分前	↑	↑				
グラニセロン	3mg/100mL	3mg/100mL	div	30min	↑					
デキサート	6.6 mg	6.6 mg								
生理食塩液	100 mL	100 mL	div	30min		↑				
デキサート	6.6 mg	6.6 mg								
アービタックス	250 mg/m2	mg	div	1hr	↓		↓			
生理食塩液	250-投与量mL	250 mL								
生理食塩液	250 mL	250 mL	div	1hr	↑		↓			
5%ブドウ糖液	50 mL	50 mL	div	keep	↑					
オキサリプラチン	85 mg/m2	mg	div	2hr	↓					
5%ブドウ糖液	250 mL	250 mL								
レボホリナート	200 mg/m2	mg	div	2hr	↓					
5%ブドウ糖液	250 mL	250 mL								
5-FU(bolus)	400 mg/m2	mg	div	3min	↓					
生理食塩液	50 mL	50 mL								
5-FU(ci)	2400 mg/m2	mg	div	46hr	↓					
生理食塩液	(自動計算) mL	0 mL								

アービタックス投与終了後経過観察1時間

初回投与時

アービタックス	400 mg/m2	mg	div	2hr	↓					
生理食塩液	500-投与量mL	500 mL								