

レジメン名	大腸癌セツキシマブ+mFOLFOX6療法(外来)(q2w)									
略名	CET+mFOLFOX6(外来)(q2w)			1クールの日数					14日	
適応病名	治癒切除不能な進行再発大腸癌(KRAS wild)			予定クール回数					PDまで	
薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day 1	day	day	day	day 14	実投与量
レスタミン錠10mg	5錠	5錠	経口	30分前	↑					
グラニセトロン デキサート	3mg/100mL 6.6 mg	3mg/100mL 6.6 mg	div	30分	↑					
アービタックス 生理食塩液	500 mg/m2 500-投与量mL	mg 500 mL	div	1-2時間	↓					
生理食塩液	250 mL	250 mL	div	1時間	↑					
5%ブドウ糖液	50 mL	50 mL	div	keep	↑					
オキサリプラチン 5%ブドウ糖液	85 mg/m2 250 mL	mg 250 mL	div	2時間	↓					
レボホリナート 5%ブドウ糖液	200 mg/m2 250 mL	mg 250 mL	div	2時間	↓					
5-FU(bolus) 生理食塩液	400 mg/m2 50 mL	mg 50 mL	div	3分	↓					
5-FU(ci) 生理食塩液	2400 mg/m2 (自動計算) mL	mg 0 mL	div	46時間	↓					

アービタックス投与終了後経過観察1時間

アービタックスの投与速度は初回2時間 2回目1.5時間 3回目以降1時間かけて投与する