

レジメン名		大腸癌ラムシルマブ+FOLFIRI療法(外来)							
略名		Ramu+FOLFIRI(外来)			1クールの日数			14日	
適応病名		大腸癌			予定クール回数			PDまで	
薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day	day	day	day	実投与量
					1				
グラニセトロン	3mg/100mL	3mg/100mL	div	30min	↑				
ポララミン	5 mg	5 mg							
デキサート	6.6 mg	6.6 mg							
サイラムザ	8 mg/kg	mg	div	1hr	↓				
生理食塩液	250mL-投与量mL	250 mL							
生理食塩液	250 mL	250 mL	div	1hr	↑				
イリノテカン	180 mg/m2	mg	div	1.5hr	↓				
5%ブドウ糖液	250 mL	250 mL							
レボホリナート	200 mg/m2	mg	div	2hr	↓				
5%ブドウ糖液	250 mL	250 mL							
5-FU(bolus)	400 mg/m2	mg	div	3min	↓				
生理食塩液	50 mL	50 mL							
5-FU(ci)	2400 mg/m2	mg	div	46hr	↓				
生理食塩液	(自動計算) mL	0 mL							

*サイラムザ投与後1時間経過観察(サイクル3以降は省略可)