

レジメン名	大腸癌 S-1+CET療法																		
略名	S-1+CET			1クールの日数			42 日												
適応病名	大腸癌			予定クール回数			PDまで												
薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day 1	day ~	day 8	day ~	day 15	day ~	day 22	day ~	day 28	day 29	day ~	day 36	day ~	day 42	実投与量
レスタミン錠10mg	5錠	5錠	経口	30分前	↑		↑		↑		↑		↑		↑		↑		
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	keep	↑		↑		↑		↑		↑		↑		↑		
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	30分	↑注		↑注		↑注		↑注		↑注		↑注		↑注		
デキサート	6.6 mg	6.6 mg																	
アービタックス	250 mg/m2	mg	div	1時間	↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓		
生理食塩液	250-投与量mL	250 mL																	
生理食塩液	250 mL	250 mL	div	1時間	↑		↑		↑		↑		↑		↑		↑		
S-1	下表参照	下表参照	p.o	朝・夕	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	

初回のみ

アービタックス	400 mg/m2	mg	div	2時間	↓														
生理食塩液	500-投与量mL	500 mL																	

注:アービタックス初回投与時はInfusion reactionの予防のためデキサートを必ず使用すること  
初回以降のデキサートは主治医が必要と判断した場合に使用する

S-1投与量

※腎機能に応じて適宜減量

BSA1.25㎡未満	80mg/day(分2)
BSA1.25㎡以上1.50㎡未満	100mg/day(分2)
BSA1.50㎡以上	120mg/day(分2)