

レジメン名	大腸癌 SOX+Bev療法													
略名	SOX+Bev		1クールの日数			21日								
適応病名	大腸癌		予定クール回数			PDまで								
薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day 1	day 2	day 3	day ~	day 14	day 15	day 16	day ~	day 21	実投与量
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	keep	↑									
パロノセトロン デキサート	0.75mg/50mL 6.6 mg	0.75mg/50mL 6.6 mg	div	15min	↑									
ベバシズマブ 生理食塩液	7.5 mg/kg 100-投与量 mL	mg 100 mL	div	90min	↓									
5%ブドウ糖液	250 mL	250 mL	div	keep	↑									
オキサリプラチン 5%ブドウ糖液	130 mg/m2 250 mL	mg 250 mL	div	2hr	↓									
S-1	80 mg/m2	mg	経口	2×1	夕	朝夕	朝夕	朝夕	朝夕	朝				
デカドロン錠0.5mg	2錠 2x朝夕	2錠 2x朝夕	経口	2×1		朝夕	朝夕							

ベバシズマブは初回投与の忍容性が良ければ2回目の投与を60分で行って良い。
 さらに2回目の忍容性も良ければそれ以降は30分で投与することができる。
 S-1の服用を第1日の午前中から開始した場合は、最終投与日は第14日の午後となる。

S-1投与量

BSA1.25㎡未満	80mg/day(分2)
BSA1.25㎡以上1.50㎡未満	100mg/day(分2)
BSA1.50㎡以上	120mg/day(分2)