

レジメン名	大腸癌 SOX+CET療法													
略名	SOX+CET			1クールの日数				21日						
適応病名	大腸癌			予定クール回数				4~6回毎に効果判定 PDまで						
薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day 1	day ~	day 7	day 8	day ~	day 14	day 15	day ~	day 21	実投与量
レスタミン錠10mg	5錠	5錠	経口	30分前	↑			↑			↑			
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	keep	↑			↑			↑			
グラニセトロン デキサート	3mg/100mL 6.6 mg	3mg/100mL 6.6 mg	div	30min	↑									
生理食塩液 デキサート	50 mL 6.6 mg	50 mL 6.6 mg	div	30min				(↑)注			(↑)注			
アービタックス 生理食塩液	250 mg/m2 250-投与量mL	mg 250 mL	div	1hr	↓			↓			↓			
生理食塩液	250 mL	250 mL	div	1hr	↑			↑			↑			
5%ブドウ糖液	250 mL	250 mL	div	keep	↑									
オキサリプラチン 5%ブドウ糖液	130 mg/m2 250 mL	mg 250 mL	div	2h	↓									
S-1	下表参照	下表参照	p.o	朝・夕	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	
初回のみ														
アービタックス 生理食塩液	400 mg/m2 500-投与量mL	mg 500 mL	div	2hr	↓									

(注)day8.15のデキサートはInfusion reactionの予防として主治医が必要と判断した場合に使用する

S-1投与量

BSA1.25㎡未満	80mg/day(分2)
BSA1.25㎡以上1.50㎡未満	100mg/day(分2)
BSA1.50㎡以上	120mg/day(分2)

※ただしCCr(Cockcroft-Gault式)≥50かつ<80(mL/min)の場合、1段階(20mg/day)減量すること
CCr<50(mL/min)は投与不可