

| レジメン名 | 大腸癌 XELIRI+CET療法 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------|---------------------|------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|------|
| 略名 | XELIRI+CET | | | 1クールの日数 | | | | 21日 | | | | | |
| 適応病名 | 大腸癌 | | | 予定クール回数 | | | | PDまで | | | | | |
| 薬品名 | 1日投与量 | 計算投与量 | 投与方法 | 投与時間 | day 1 | day ~ | day 8 | day ~ | day 14 | day 15 | day ~ | day 21 | 実投与量 |
| レスタミン錠10mg | 5錠 | 5錠 | 経口 | 30分前 | ↑ | | ↑ | | | ↑ | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 50 mL | div | keep | ↑ | | ↑ | | | ↑ | | | |
| グラニセトロン デキサート | 3mg/100mL 6.6 mg | 3mg/100mL 6.6 mg | div | 30min | ↑ | | | | | | | | |
| 生理食塩液 デキサート | 50 mL 6.6 mg | 50 mL 6.6 mg | div | 30min | | | (↑)注 | | | (↑)注 | | | |
| アービタックス 生理食塩液 | 250 mg/m2 250-投与量mL | mg 250 mL | div | 1hr | ↓ | | ↓ | | | ↓ | | | |
| 生理食塩液 | 250 mL | 250 mL | div | 1hr | ↑ | | | | | | | | |
| 5%ブドウ糖液 | 250 mL | 250 mL | div | keep | ↑ | | | | | | | | |
| イリノテカン 5%ブドウ糖液 | 200 mg/m2 250 mL | mg 250 mL | div | 1hr | ↓ | | | | | | | | |
| カペシタビン | 1600 mg/m2 | mg | p.o | 朝・夕 | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | | | |
| 初回のみ | | | | | | | | | | | | | |
| アービタックス 生理食塩液 | 400 mg/m2 500-投与量mL | mg 500 mL | div | 2hr | ↓ | | | | | | | | |

※65歳以上は20%減量すること

(注)day8.15のデキサートはInfusion reactionの予防として主治医が必要と判断した場合に使用する