

| レジメン名 | 大腸癌 XELODA+ベバシズマブ療法 | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|--------|------|---------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|------|
| 略名 | XELODA+Beva | | | 1クールの日数 | | | | 21日 | | | | |
| 適応病名 | 大腸癌 | | | 予定クール回数 | | | | PDまで | | | | |
| 薬品名 | 1日投与量 | 計算投与量 | 投与方法 | 投与時間 | day 1 | day 2 | day ~ | day 14 | day 15 | day ~ | day 21 | 実投与量 |
| 生理食塩液 | 50 mL | 50 mL | div | keep | ↑ | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 100-投与量 mL | 100 mL | div | 30~ | ↓ | | | | | | | |
| ベバシズマブ | 7.5 mg/kg | mg | | 90min | | | | | | | | |
| カペシタビン | 2000 mg/m2 | mg | p.o | 朝・夕 | ↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓ | | |
| または | | | | | | | | | | | | |
| カペシタビン | 2000 mg/m2 | mg | p.o | 朝・夕 | | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | | | |