

レジメン名		大腸癌 XELOX+CET療法										
略名		XELOX+CET		1クールの日数				21日				
適応病名		大腸癌		予定クール回数				PDまで				
薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day 1	day ~ 8	day ~ 14	day 15	day ~ 21	実投与量		
レスタミン錠10mg	5錠	5錠	経口	30分前	↑		↑		↑			
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	keep	↑		↑		↑			
グラニセトロン デキサート	3mg/100mL 6.6 mg	3mg/100mL 6.6 mg	div	30min	↑							
生理食塩液 デキサート	50 mL 6.6 mg	50 mL 6.6 mg	div	30min			(↑)注		(↑)注			
アービタックス 生理食塩液	250 mg/m2 250-投与量mL	mg 250 mL	div	1hr	↓		↓		↓			
生理食塩液	250 mL	250 mL	div	1hr	↑							
5%ブドウ糖液	250 mL	250 mL	div	keep	↑							
オキサリプラチン 5%ブドウ糖液	130 mg/m2 250 mL	mg 250 mL	div	2hr	↓							
カペシタビン	2000 mg/m2	mg	p.o	朝・夕	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓			
初回のみ												
アービタックス 生理食塩液	400 mg/m2 500-投与量mL	mg 500 mL	div	2hr	↓							

(注)day8.15のデキサートはInfusion reactionの予防として主治医が必要と判断した場合に使用する