| レジメン名 | 膵癌GEM+タルセバ療法 | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|-------------|-----------|---------|---------|--------------|--------------|--------------|----------|-------|----|-----|
| 略名 | GEM+タルセバ | | | 1クールの日数 | | | | 28 日 | | | | 日 |
| 適応病名 | 膵癌 | | | | 予定クール回数 | | | | | PDになる | まで | |
| 薬品名 | | 1日投与量 | 計算投与量 | 投与 | 投与 | | day | day day day | day | 実投与量 | | |
| 未 加 石 | | 口仅分里 | 引昇仅分里 | 方法 | 時間 | 1 | 8 | 15 | 15 22 28 | 天权子里 | | |
| グラニセトロン | | 3mg/100mL | 3mg/100mL | div | 30min | 1 | 1 | 1 | | | | |
| デキサート | | 6.6 mg | 6.6 mg | | | | | | | | | |
| ゲムシタビン | | 1000 mg/m2 | mg | div | 30min | \downarrow | \downarrow | \downarrow | | | | |
| 生理食塩液 | | 100 mL | 100 mL | | | | | | | | | |
| タルセバ錠 | | 100 mg/body | 100 mg | 内服 | 食間 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 連日招 |

^{*} タルセバは、食事の1時間以上前又は食後2時間以降に1日1回経口投与する。