

レジメン名	進行性腎細胞癌IL-2+IFN-alpha+UFT療法											
略名	IL-2+IFN-alpha+UFT	1クールの日数							56日			
適応病名	腎細胞癌	予定クール回数							回			
薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day 1	day 2	day 3	day 4	day 5	day 6	day 7	実投与量
第1週												
イムネース35 5%ブドウ糖液	35~105 万JRU 250 mL	35~105 万JRU 250 mL	div	2hr	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓			
第2週												
スミフェロン	300 万JRU/m2	万JRU/m2	im			↓		↓		↓		
第3週												
イムネース35 5%ブドウ糖液	35~105 万JRU 250 mL	35~105 万JRU 250 mL	div	2hr	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓			
第4~7週												
スミフェロン	300 万JRU/m2	万JRU/m2	im			↓		↓		↓		
UFT	300 mg	300 mg	po		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	

- 第1週 第1日:IL-2 35万単位を生理食塩水100mLに溶解し、30分以上かけて点滴静注する。
これを1日2回投与する。
第2日:第1日の副作用が軽微である場合には、70万、70万の2回投与に増量する。
第3-5日:さらに増量が可能と判断された場合、105万、70万の2回投与、105万、105万の1日210万単位まで増量する。
- 第3週 第1週で投与し得た最大1日投与量を5日間投与する。