

レジメン名	ニボルマブ+カボザンチニブ療法		
略名	nivolumab+cabozantinib	1クールの日数	14日または28日
適応病名	腎細胞癌	予定クール回数	カボザンチニブはPDまで オプジーボは最長2年継続*1

オプジーボ2週投与の場合

薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day	day	day	day	実投与量
					1			14	
生理食塩液	100 mL	100 mL	div	keep	↑				
オプジーボ	240 mg/body	240 mg/body	div	30分	↓				
生理食塩液	76 mL	76 mL							
カボメティクス	40 mg/body	40 mg/body	po	1日1回**2	↓	↓	↓	↓	

オプジーボ4週投与の場合

薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day	day	day	day	実投与量
					1			28	
生理食塩液	100 mL	100 mL	div	keep	↑				
オプジーボ	480 mg/body	480 mg/body	div	30分	↓				
生理食塩液	52 mL	52 mL							
カボメティクス	40 mg/body	40 mg/body	po	1日1回**2	↓	↓	↓	↓	

※1:2022.4時点

※2:空腹時服用(食事の影響を避けるため、食事の1時間前から食後2時間までの間の服用は避けること)