

レジメン名	膵・消化管神経内分泌腫瘍ストレプトゾシン+5-FU療法												
略名	STZ+5-FU	1クールの日数										42日	
適応病名	膵・消化管神経内分泌腫瘍	予定クール回数										PDまで	
薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day	day	day	day	day	day	day	day	実投与量
					1	2	3	4	5	~	~	42	
生理食塩液	500 mL	500 mL	div	2時間	↑	↑	↑	↑	↑				
グラニセトロン デキサート	3mg/100mL 6.6 mg	3mg/100mL 6.6 mg	div	30分	↑	↑	↑	↑	↑				
ザノサー	500 mg/m2	mg	div	30分	↓	↓	↓	↓	↓				
生理食塩液	100 mL	100 mL											
5-FU	400 mg/m2	mg	div	30分	↓	↓	↓	↓	↓				
生理食塩液	100 mL	100 mL											
生理食塩液	500 mL	500 mL	div	60分	↑	↑	↑	↑	↑				
内服													
アプレピタントカプセル	125 mg	125 mg	経口		↑								
	80 mg	80 mg	経口			↑	↑						

白血球<2000/ $\mu$ lもしくは血小板<50000/ $\mu$ l:5-FU25%減量  
 重度の吐き気・嘔吐もしくは腎障害(Cre>1.5mg/dLもしくは尿蛋白(+)):STZ50%減量