

レジメン名		A+AVD療法																		
略名		A+AVD		1クールの日数		28日														
適応病名		ホジキンリンパ腫		予定クール回数		6回														
薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day 1	day 2	day 3	day ~	day 10	day ...	day 15	day 16	day 17	day ~	day 24	day ...	day 28	実投与量		
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	keep	↑						↑									
グラニセトロン デキサート	3mg/100mL 6.6 mg	3mg/100mL 6.6 mg	div	30分	↑						↑									
ドキソルビシン 生理食塩液	25 mg/m2 50-投与量 mL	mg 50 mL	div	30分	↓						↓									
エクザール 生理食塩液	6 mg/m2 20 mL	mg 20 mL	iv	ゆっくり	↓						↓							(最大10mg)		
ダカルバジン 生理食塩液	375 mg/m2 500 mL	mg 500 mL	div	3時間	↓						↓							(遮光)		
イブプロフェン	200 mg	200 mg	経口		↑						↑									
レスタミン	30 mg	30 mg	経口		↑						↑									
アドセトリス 注射用水 生理食塩液	1.2 mg/kg (10.5mL/Vで溶解) 100-投与量 mL	mg 10.5mL/Vで溶解 100 mL	div	60分	↓						↓									
フィルグラスチム	75 μg/body	75 μg/body	sc				↓	↓	↓				↓	↓	↓					

イブプロフェン レスタミンはアドセトリス開始30分前に投与