

| レジメン名 | 未治療CD30陽性末梢性T細胞リンパ腫A+CHP療法 | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------------------------------|---------|------|-------|-------|---------|-------|-------|--------|------|
| 略名 | A+CHP療法 | | 1クールの日数 | | | | 21日 | | | | |
| 適応病名 | CD30陽性末梢性T細胞リンパ腫 | | 予定クール回数 | | | | 6もしくは8回 | | | | |
| 薬品名 | 1日投与量 | 計算投与量 | 投与方法 | 投与時間 | day 1 | day 2 | day 3 | day 4 | day 5 | day 21 | 実投与量 |
| アセトアミノフェン200mg | 2錠 | 2錠 | 経口 | | ↑ | | | | | | |
| レスタミン錠10mg | 3錠 | 3錠 | 経口 | | ↑ | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 50 mL | div | keep | ↑ | | | | | | |
| アドセトリス 注射用水 生理食塩液 | 1.8 mg/kg (10.5mL/Vで溶解) 100-投与量 mL | mg (10.5mL/Vで溶解) 100 mL | div | 1hr | ↓ | | | | | | |
| グラニセトン | 3mg/100mL | 3mg/100mL | div | 30分 | ↑ | | | | | | |
| エンドキサン 生理食塩液 | 750 mg/m2 500 mL | mg 500 mL | div | 3時間 | ↓ | | | | | | |
| ドキシソルビシン 生理食塩液 | 50 mg/m2 100-投与量 mL | mg 100 mL | div | 30分 | ↓ | | | | | | |
| プレドニゾン | 100 mg/body | 100 mg | 経口 | | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | |
| ジーラスタ | 3.6 mg | 3.6 mg | sc | | | | ↓ | | | | |