

レジメン名	濾胞性リンパ腫G-B療法 1クール													
略名	G-B(1)		1クールの日数			28日								
適応病名	濾胞性リンパ腫		予定クール回数			1回(次クールへ移行)								
薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day 1	day 2	day 3	day ...	day 8	day ...	day 15	day ...	day 28	実投与量
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	keep	↑	↑			↑		↑			
デキサート	16.5 mg	16.5 mg	div	30分	↑				↑		↑			
生理食塩液	100 mL	100 mL		※ ¹										
アセトアミノフェン	400 mg	400 mg	経口	※ ¹	↑				↑		↑			
レスタミン	30 mg	30 mg	経口	※ ¹	↑				↑		↑			
ガザイバ	1000 mg	1000 mg	div	※ ²	↓				↓		↓			1000
生理食塩液	210 mL	210 mL												

ガザイバ投与後30分間経過観察

グラニセトロン	3mg/100mL	3mg/100mL	div	30分	↑									
デキサート	6.6 mg	6.6 mg	div		↑									

ベンダムスチン60分投与の場合

ベンダムスチン	90 mg/m ²	mg	div	60分	↓	↓								
生理食塩液	250-投与量mL	250 mL												250 mL

ベンダムスチン10分投与の場合

ベンダムスチン	90 mg/m ²	mg	div	10分	↓	↓								
生理食塩液	50 mL	50 mL												

※¹ステロイドはガザイバ投与1時間前まで、抗ヒスタミン薬と解熱鎮痛剤はガザイバ投与30～60分前までに投与すること

※²初回投与:50mg/時で開始し、30分毎に50mg/時ずつ、最大400mg/時まであげることができる

2回目以降:前回の投与でG2以上のinfusion reactionが発現しなかった場合、100mg/時で開始し、30分毎に

100mg/時ずつ、最大400mg/時まで上げることができる